

# INFORMATION FÜR ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

Kinder in Österreich werden häufig zu spät und **zu wenig konsequent durch Impfungen gegen lebensgefährliche Krankheiten geschützt**. Bei fast jedem fünften Kind fehlt beispielsweise die zweite notwendige Masernimpfung.

Masern sind **keine einfache Kinderkrankheit**, sondern **hoch ansteckend** und betreffen ungeschützte Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene! Es kommt zu Fieber, Schnupfen, Husten und Bindehautentzündung, begleitet vom typischen Hautausschlag (rote, großflächige Flecken). Masern schwächen die **Abwehrkräfte des Körpers** dermaßen, dass über mehrere Jahre ein erhöhtes Risiko besteht, an einer anderen Infektionskrankheit zu sterben! Die Masern-Infektion selbst kann nicht behandelt werden. Bei etwa jedem 5. kommt es zu schwerwiegenden Krankheitsfolgen wie **Bronchitis, Mittelohr- und/oder Lungenentzündung**. Auch eine lebensbedrohliche **Gehirnentzündung** ist möglich.

Mit der Impfung können Sie sich selbst, Ihre Familie und Ihr Umfeld schützen! Empfohlen sind **2 Impfungen gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR)**. Es kann ab dem vollendeten 9. Lebensmonat geimpft werden. Fehlende Impfungen können jederzeit nachgeholt werden. Der Masernimpfstoff ist für **alle an öffentlichen Impfstellen kostenfrei erhältlich**.

**Bei fehlendem Masernschutz kann Ihr Kind bei Kontakt mit einer an Masern erkrankten Person von der Gesundheitsbehörde bis zu 21 Tage von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergarten, Schule, Hort, etc. ausgeschlossen werden (§§ 6 ff. Epidemiegesetz).**

Folgende **wichtige** Impfungen sind im **kostenfreien Impfkonzert** verfügbar:

- Masern-Mumps-Röteln ab dem 10. Lebensmonat für alle Altersgruppen
- Rotavirus bis 7. Lebensmonat
- 6-fach: Diphtherie-Tetanus-Polio-Pertussis-Hepatitis B-Haemophilus: im 1. und 2. Lebensjahr
- Pneumokokken: im 1. und 2. Lebensjahr (Kinder mit Risiken bis 5. Lebensjahr)
- 4-fach: Diphtherie-Tetanus-Polio-Pertussis im 7.–9. Lebensjahr, und wenn in der Volksschule nur 3-fach-Impfung geimpft wurde auch im 13. Lebensjahr
- Meningokokken ACWY: 11.–13. Lebensjahr
- Hepatitis B: bis zum 15. Lebensjahr
- Humane Papillomaviren im 10.–12. Lebensjahr, im 13.–15. Lebensjahr vergünstigter Selbstkostenpreis an öffentlichen Impfstellen

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, Ihrer Apotheke oder bei den öffentlichen Beratungs- und Impfstellen der Bundesländer: [www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/impfen](http://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/impfen)

Impfbroschüre: [www.sozialministerium.at/Impfbroschuere](http://www.sozialministerium.at/Impfbroschuere)

Impfplan Österreich 2019: [www.sozialministerium.at/Impfplan](http://www.sozialministerium.at/Impfplan)